



**INGREDIENTE ACTIVO:** Trifloxystrobin + Tebuconazole.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** NATIVO® es una Suspensión Concentrada (SC) que contiene 100 gramos de Trifloxystrobin + 200 g de Tebuconazole por litro de producto comercial.

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** Su alta proporción de Tebuconazole le permite tener un alto poder de supresión de las enfermedades presentes y el Trifloxystrobin le confiere la residualidad necesaria. Mantiene sano y verde al cultivo por más tiempo, con el consecuente mejoramiento en el rendimiento final por un mayor llenado y número de grano. El producto es absorbido rápidamente por hojas y tallos verdes, y es redistribuido por toda la planta. Posee efecto residual de protección del cultivo.

**MODO DE ACCIÓN:** Debido al modo de acción de Trifloxystrobin y de Tebuconazole, NATIVO® puede ser utilizado en forma preventiva y/o curativa. Trifloxystrobin tiene una actividad mesostémica, caracterizada por su alta afinidad con la superficie de la planta. Una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Trifloxystrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorias en la epidermis del tejido vegetal. Tebuconazole es incorporado a la planta y distribuido en forma ascendente. Actúa sobre los hongos patógenos durante la penetración y formación de haustorias. Detiene el crecimiento del hongo, interfiriendo en la biosíntesis de sus membranas celulares. Tiene acción preventiva y fuertemente curativa.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda la aplicación de NATIVO® en la formación de primordio floral (embuchamiento) y llenado del grano. Se sugieren dos aplicaciones en bloque con frecuencia de 15 días.

**PERIODO DE CARENCIA:** Arroz 35 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** NATIVO® debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción; siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo. Realizar las aplicaciones de acuerdo al estado vegetativo de la planta y la incidencia de la enfermedad de acuerdo a la evaluación.

**COMPATIBILIDAD DE MEZCLA:** MESUROL® es compatible con la mayoría de insecticidas de uso común, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla, corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** III (Ligeramente peligroso)

**COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO:** NATIVO® No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

**PRECAUCIONES:** El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

**GUÍA PARA EL MÉDICO:** Aplique tratamiento sintomático.

**Para mayor información dirigirse a:**

**Para la Sierra:** CIATOX, Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Dra. Consuelo Meneses M, Teléfonos de contacto.: 593- 2- 2906162 Ext. 221/ 593- 2- 2565858 3226268 Línea gratuita: 1800 836366. En caso de intoxicación, derrame o incendio: Cisproquim (Quito, La Sierra, Centro y Norte): 1800-59-3005

**Para la Costa:** CITOX Centro de Información Toxicológico. Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio Tel.: (5934)04245-1022 Móvil: 098275025 Fax: (5934)042452700 Ext. 4241. En caso de intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo Noboa Montalvo. Celular 09-9426154 (Guayaquil)



**PRESENTACIONES:**

Envase x 600cc

Envase x 1 L

**REGISTRO:** 195 – F1/NA

**RECOMENDACIÓN DE USO:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	PC (PERÍODO DE CARENCIA)
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	<b>Manchado del grano</b> ( <i>Sarocladium oryzae</i> )	0,6	35 días
TOMATE DE ÁRBOL ( <i>Cyphomandra betacea</i> )	<b>Antracnosis</b> ( <i>Colletotrichum loeosporoides penz.</i> )	1,1	7 días